

Liebe Patientin, lieber Patient! Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt, Therapeuten oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation



# Hyperforat® Nervo<sup>hom</sup>

Wirkstoffe: Hypericum perforatum Dil. D4, Valeriana officinalis Dil. D4 und Strychnos ignatii Dil. D4

---

### Zusammensetzung:

1 Ampulle (2 ml) enthält:

Wirkstoffe:

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Hypericum perforatum Dil. D4  | 0,660 g |
| 2. Valeriana officinalis Dil. D4 | 0,671 g |
| 3. Strychnos ignatii Dil. D4     | 0,670 g |

Bestandteile 1 bis 3 gemeinsam potenziert über die letzten zwei Stufen.

Sonstiger Bestandteil:

Mannitol (Isotonisierungsmittel).

**Hergestellt nach dem homöopathischen Arzneibuch.**

### Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung in Originalpackungen mit 5 (N1), 10 (N1), 50 (N2) und 100 (N3) Ampullen à 2 ml zur i.m., s.c. bzw. i.v. Injektion.

Empfehlung:

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Steinfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach/Schwarzwald

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen mit Unruhe und Verstimmungszuständen.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Gegenanzeigen:

Nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit und bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren.

### Vorsichtsmaßnahmen:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Jugendlichen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

Wenn die nervösen Störungen und Verstimmungszustände länger andauern oder neu auftreten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung und Behandlung bedürfen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Hinweis:**

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Selbstmedikation bestimmt.

**Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:**

Erwachsene erhalten parenteral 1 - 2 ml einmal täglich intramuskulär, subkutan oder langsam intravenös injiziert.

Die Dosierung für Jugendliche ab 12 Jahren wird vom behandelnden Arzt festgelegt.

Eine über eine Woche hinausgehende akute Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Hinweis:**

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Hinweis für den Fall der unterlassenen Anwendung:**

Nach einer vergessenen Anwendung sollte dann nicht die doppelte Menge angewendet werden.

Die Ampullen sollten nach dem Öffnen sofort verwendet werden. Angebrochene Ampullen dürfen nicht aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden, da die Sterilität der Injektionsflüssigkeit nicht mehr gewährleistet ist.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

**Hinweis:**

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Hinweis:**

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist am Umkarton und an der Ampulle aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25° C aufbewahren

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Stand der Information:**

August 2010