

Salus Fenchelhonig

0,034 g/ 76 g pro 100 g Sirup

Zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr
und Erwachsenen

Wirkstoffe:

Bitterfenchelöl und Honig

Zur Unterstützung der Schleimlösung



Traditionelles pflanzliches Arzneimittel

Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet zur Unterstützung der
Schleimlösung im Bereich der Atemwege.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Über-
lieferung und langjähriger Erfahrung.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Salus Fenchelhonig nicht
anwenden?

Sie dürfen Salus Fenchelhonig nicht einnehmen,
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen
Fenchel oder einen der sonstigen Bestandteile
von Salus Fenchelhonig sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen Sie
beachten?

Bei Fieber, Atemnot sowie bei über 5 Tage
anhaltenden oder unklaren Beschwerden ist
ein Arzt aufzusuchen.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und
Stillzeit beachten?

Fragen Sie vor der Einnahme/ Anwendung
von allen Arzneimitteln einen Arzt oder
Apotheker um Rat.

Für die Anwendung von Salus Fenchelhonig
in Schwangerschaft und Stillzeit sind keine
besonderen Risiken bekannt. Da aber keine
ausreichenden Untersuchungen für die
Anwendung von Salus Fenchelhonig vorlie-
gen, wird die Anwendung des Arzneimittels
in Schwangerschaft und Stillzeit nicht emp-
fohlen.

Was müssen Sie bei Säuglingen beachten?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei
Säuglingen liegen keine ausreichenden
Untersuchungen vor. Die Anwendung von
Salus Fenchelhonig bei Kindern unter 1 Jahr
wird daher nicht empfohlen.

Wann sollten Sie Salus Fenchelhonig
erst nach Rücksprache mit einem Arzt
anwenden?

Dieses Arzneimittel enthält eine Mischung
aus Glucose und Fructose.

Bitte nehmen Sie Salus Fenchelhonig erst
nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn
Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer
Unverträglichkeit gegenüber bestimmten
Zuckern leiden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von
Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte
weitere Bestandteile von Salus Fenchelhonig

Salus Fenchelhonig kann schädlich für die
Zähne sein (Karies).

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheke,
wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder
anwenden bzw. vor kurzem eingenommen
oder angewendet haben, auch wenn es sich
um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
handelt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Kinder
ab 6 Jahren und Erwachsene mehrmals täglich
5 ml mit dem beiliegenden Messbecher ein.
Mehr als 20 ml sollten täglich nicht eingenom-
men werden.

Kleinkinder ab 1 Jahr erhalten entsprechend
weniger (2,5 ml mit dem Fläschchen oder im
Brei).

Hinweis für Diabetiker:

5 ml entsprechen 0,3 BE

Art der Anwendung:

zum Einnehmen

Dauer der Anwendung:

Zur Dauer der Anwendung beachten Sie bitte
die Angaben unter „Vorsichtsmaßnahmen für
die Anwendung und Warnhinweise“.

Bitte wenden



Salus Fenchelhonig

Fortsetzung

Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge Salus Fenchelhonig eingenommen haben als Sie sollten:

In der Regel hat dies keine nachteiligen Folgen. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Salus Fenchelhonig vergessen haben:

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Nebenwirkungen:

Wie alle Arzneimittel kann Salus Fenchelhonig Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege möglich.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen ist die Einnahme von Salus Fenchelhonig zu beenden und ein Arzt aufzusuchen.

Sollten Sie weitere Nebenwirkungen beobachten, so teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise:

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett) nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch: 4 Monate.

Zusammensetzung:

100 g Sirup enthalten als Wirkstoffe:	
Bitterfenchelöl	0,034 g
Honig	76,000 g
als sonstige Bestandteile:	
Malzextrakt, Wasser	

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 250 ml Sirup

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 24
83052 Bruckmühl
info@salus.de

Fassung der Packungsbeilage:

Juni 2011

palde-v3-2011-06-fenchelhonig